จะทำอย่างไรหากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด

1. รีบล้างบริเวณแผลด้วย สบู่ "ทันที"
2. รีบไปพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ทันท่วงที
3. รีบกักสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

การเก็บรักษาวัคซีน

วัคซีนจะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ไม่นำวัคซีนไปแช่ในช่องแช่แข็ง หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่นำวัคซีนมาวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น

หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัสกับแสงแดด

กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุลงในกล่องรักษาความเย็นหรือกระเป๋าวัคซีนที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับ 2-8 องศาเซลเซียส

วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรง ต้องนำไปใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการสัมผัสน้ำโดยตรงก่อนบรรจุลงในกล่องรักษาความเย็น

กลุ่มควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 4181-2 www.dld.go.th

โรคพิษสุนัขบ้า รู้ไว้...ป้องกันได้

รักน้องหมา อย่าลืมพาน้องไป ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นะจ๊ะ

สแกนด้วย CamScanner

Q A

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเรบีส์ไวรัส (Rabies virus)

สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง

สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งในประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัขมากที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากทางไหนได้บ้าง

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือข่วน หรือเข้าทางเยื่อบุตา ปาก จมูก ที่มีแผลหรือรอยถลอกได้ ซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย

สแกนด้วย CamScanner

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิดอาการภายในกี่วัน

ไม่แน่นอน ระยะเวลาการเกิดโรคขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัดว่าใกล้เส้นประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาหายได้หรือไม่

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิตเท่านั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน

สุนัขต้องได้รับการฉีด วัคซีน ครั้งแรกที่อายุ 12 สัปดาห์ เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี

อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้ายจะสามารถสังเกตอาการได้ชัด คือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่เงียบๆ แสดงอาการทางระบบประสาท กระวนกระวาย กัดแทะสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า คางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก

โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะหน้าร้อนใช่หรือไม่

ไม่ใช่

โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ ตลอดทั้งปี